

Lluvia por debajo del promedio en el Pacífico - norte de Centroamérica

Mensajes Claves

- Se registraron lluvias por debajo del promedio, con finalización anticipada en el Pacífico-norte de Centroamérica.
- Se observó lluvia por arriba del promedio en zonas del Caribe de Honduras y Nicaragua.
- Persisten condiciones secas en Venezuela y partes de Colombia.


FINALIZACION TEMPRANA DE LA TEMPORADA DE LLUVIA EN EL PACÍFICO NORTE DE CENTROAMÉRICA

Durante octubre e inicios de noviembre, se observaron lluvias por debajo del promedio en la región del Pacífico norte de Centroamérica, lo que provocó una finalización temprana de la temporada de lluvias. Esta situación afectó negativamente el desarrollo de cultivos de granos básicos de la temporada de Segunda, principalmente en zonas del Corredor Seco. En la Figura I, en color corinto, se muestra condiciones de precipitación que no superan el 45 por ciento de las lluvias respecto al promedio histórico, distribuidas ampliamente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y partes de Honduras. Estos déficits han sido continuos desde la temporada de Primera. A pesar de ello, la distribución errática de lluvias ha provocado inundaciones focalizadas debido a lluvias abundantes en corto periodo de tiempo, amenazando zonas de cultivo en Izabal y la Franja Transversal del Norte en Guatemala.

El Caribe de Nicaragua y partes del Caribe hondureño reportan precipitaciones por arriba del promedio. Sin embargo, la distribución de lluvia ha sido desigual, con eventos extremos en períodos cortos de tiempo. Si bien el acumulado e 30 días muestra valores altos, éstos no son apropiados para el desarrollo de cultivos.

La temporada de frentes fríos inició en octubre, de acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). En la región occidental de Guatemala, estos frentes fríos han provocado descensos considerables de temperatura, sin llegar al punto de congelación; y han causado el aumento de la velocidad del viento, dañando los cultivos por acame. A pesar de estos descensos puntuales por el paso de frentes fríos, las temperaturas continúan mostrando valores por arriba del promedio. La amplitud térmica también ha afectado el desarrollo normal de cultivos de granos básicos, estresando las plantas. Los déficits de humedad han afectado la disponibilidad hídrica en algunos ríos cercanos a las zonas de siembra, limitando la capacidad de riego en zonas de producción extensiva.

Figura I. Porcentaje de lluvia (%), octubre 21 – noviembre 20, 2025.



Fuente: UCSB/USGS/FEWSNET



La información proporcionada en este informe no es información oficial del Gobierno de Estados Unidos y no representa las opiniones o posiciones del Departamento de Estado ni del Gobierno de Estados Unidos.

FEWS NET Centroamérica y norte de Suramérica

lac@fews.net

fews.net/latin-america-and-caribbean

En Venezuela y Colombia, si bien los pronósticos sugerían un aumento de las lluvias en noviembre, los registros indican una disminución significativa de las precipitaciones. Se observan valores que no superan el 60 por ciento respecto al promedio histórico, ampliamente distribuidos en Venezuela. Por cuarto mes consecutivo los valores siguen siendo negativos, afectando la disponibilidad hídrica para cultivos y consumo humano. Las altas temperaturas y bajos acumulados de lluvia afectan la salud de la vegetación, principalmente en la zona oriental de Venezuela.

En Colombia, persisten lluvias deficitarias en partes de Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía regiones donde persisten acumulados por debajo del promedio durante más de 90 días. A pesar de ello, se han observado inundaciones repentinas provocadas por lluvias en periodos cortos. Las temperaturas continúan con registros por arriba del promedio, lo que incrementa la evapotranspiración y reduce la disminución de recurso hídrico.


LLUVIAS CERCANAS AL PROMEDIO SE ESPERAN EN LA SIGUIENTE SEMANA

Según la Figura 3, se prevé que, durante el periodo del 25 de noviembre al 1 de diciembre 2025, las lluvias se mantengan cercanas al promedio. La región del Pacífico-norte de Centroamérica ya se encuentra en la temporada seca; sin embargo, en el norte de Guatemala, así como, el Caribe de Honduras y Nicaragua las lluvias continúan. El pronóstico sugiere lluvia por debajo del promedio en Honduras, Costa Rica y partes de Panamá.

En Colombia y Venezuela, se esperan lluvias por arriba del promedio en las zonas identificadas con tono verde y azul, principalmente en el noroeste de ambos países. Se espera un aumento de la humedad en los suelos y una reducción de los valores deficitarios. Para el resto de las zonas, se esperan condiciones cercanas al promedio, pero que serán insuficientes para reducir déficit de largo plazo.


El pronóstico de temperatura sugiere anomalías positivas de 1 a 2 grados centígrados en la región. En Guatemala podrían registrarse descensos de temperaturas por el paso frentes fríos. Dependiendo de su intensidad, podrían provocar condiciones de congelamiento en áreas elevadas del occidente guatemalteco y el aumento de lluvias en el norte y el Caribe de Guatemala y Honduras. El aumento de la velocidad del viento podría provocar incendios forestales debido a las condiciones secas predominantes en gran parte de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Figura 2. Porcentaje de lluvia (%), octubre 21 – noviembre 20, 2025.



Fuente: UCSB/USGS/FEWSNET

Figura 3. Anomalía de lluvia en milímetros del 25 de noviembre al 1 de diciembre, 2025



Fuente: CPC/NOAA



La información proporcionada en este informe no es información oficial del Gobierno de Estados Unidos y no representa las opiniones o posiciones del Departamento de Estado ni del Gobierno de Estados Unidos.

FEWS NET Centro y Norte de Suramérica

lac@fews.net

fews.net/latin-america-and-caribbean