

Se agudiza el déficit de lluvias en la región

Mensajes Clave

- El déficit de lluvia afecta la mayor parte de la región antes y durante el periodo estacional de la canícula.
- Se incrementa el déficit de lluvia en partes de Venezuela y Colombia.
- Los pronósticos sugieren temperaturas por arriba del promedio y continuidad de condiciones secas hasta finales de agosto.

Condiciones Secas Previas a la Canícula Reducen Humedad del Suelo


En Centroamérica, se reportan condiciones secas en la mayor parte de la región desde inicios de junio. Sin embargo, algunas áreas focalizadas de la Franja Transversal del Norte, en Guatemala, mostraron un aumento en la cantidad y días de lluvia observados durante el mes de junio: Estas precipitaciones fueron suficientes para reducir el déficit estacional de los últimos 30 días, tendencia que refleja el pronóstico para las siguientes dos semanas, tal y como se observa en la Figura 1.

Los reportes de los ministerios de agricultura de Guatemala, Honduras y El Salvador indican complicaciones en el desarrollo normal de cultivos con algunas áreas mostrando reducción de rendimientos, coincidiendo con las zonas con precipitaciones más bajas. Asimismo, las altas temperaturas han favorecido el estrés térmico en las plantas y la propagación de plagas y enfermedades. Debido a la distribución errática de la lluvia observada al inicio de la temporada lluviosa, las zonas de producción en la región norte de Centroamérica muestran fases fenológicas escalonadas, por lo que la afectación varía según las fechas de siembra. Durante julio, las anomalías de temperatura superaron los 3 grados centígrados respecto al promedio histórico, con lo cual se ha reducido la disponibilidad de humedad en los cultivos de granos básicos.

En Venezuela y Colombia, los registros muestran un aumento de las lluvias en la zona central de Venezuela que ha favorecido la reducción de déficits estacionales en los últimos 30 días, sin embargo, los pronósticos de corto plazo sugieren el retorno de condiciones. En la región oriente de Venezuela se reporta un aumento inusual de los puntos de calor, según el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS)

Figura 1


Porcentaje de lluvia y pronóstico (%), julio 26 – agosto 10, 2026.



Fuente: UCSB/FEWS NET

Figura 2

Porcentaje de lluvia (%), julio 26 – agosto 10, 2026



Fuente: UCSB/FEWS NET



por sus siglas en inglés). Este aumento anormal es un efecto de las condiciones anormalmente cálidas registradas en la zona, con anomalías de temperatura de hasta de 2 grados centígrados respecto al promedio en los últimos 21 días observados.

Se Esperan Condiciones Secas en Guatemala, El Salvador, Honduras; y Partes de Venezuela y Colombia


De acuerdo con la Figura 1, el pronóstico de corto plazo sugiere que las condiciones secas predominarán hasta el 10 de agosto de 2026 en la mayor parte de la región- El Golfo de Fonseca y partes del oriente de Guatemala Así mismo, gran parte del Pacífico de Centroamérica muestra acumulados de lluvias que no superan el 60 por ciento del promedio, coincidiendo con el Corredor Seco, que suele ser una de las áreas más afectadas bajo las condiciones del evento de El Niño.

En Venezuela y Colombia, los pronósticos de 15 días sugieren un retorno de las condiciones secas principalmente en las regiones oriente y noroccidente de Venezuela, y las áreas limítrofes con Colombia, La región central de Colombia también muestra condiciones de lluvia por debajo del promedio para los primeros diez días del mes de agosto según la Figura 2.

En el norte de Centroamérica, los cultivos de la temporada de Primera que presentaron retrasos en las fechas usuales de siembra podrían mostrar problemas durante el llenado del grano y la formación de espiga. Además, el aumento de plagas y enfermedades en las áreas de producción de granos básicos de subsistencia podría afectar los rendimientos de cultivos en la temporada de Segunda. A esto se suma el riesgo a estrés hídrico y térmico en etapas fenológicas tempranas.

De acuerdo a la Figura 3, los servicios meteorológicos de la región norte centroamericana coinciden en un pronóstico de lluvias por debajo del promedio en la mayor parte de Guatemala, El Salvador y el centro de Honduras, áreas representadas en tonalidad marrón. Según el análisis elaborado por los expertos de la región las temperaturas continuarán siendo por arriba del promedio. La combinación de ambos pronósticos sugiere una reducción en los rendimientos de cultivos de granos básicos de Primera y un retraso en las fechas de siembra en la temporada de Segunda.

Cita recomendada: FEWS NET. América Latina y el Caribe Monitoreo Estacional Julio 31, 2026: Se agudiza el déficit de lluvias en la región, 2026.



Monitoreo Estacional

El monitor estacional se produce para cada una de las cuatro regiones cubiertas por FEWS NET durante la estación de producción. Este informe actualiza los totales de las precipitaciones, las repercusiones sobre la producción y el pronóstico a corto tiempo. Producido por el científico regional del Servicio de Prospección Geológica de Estados Unidos de FEWS NET, el informe es producido cada 20 días durante la estación de producción. Conozca [más](#) sobre nuestro trabajo.